

芽創、レントゲン潰瘍。
用法 1日1〜2回患部に塗布、症状に応じ増減。
包装 〔軟〕20g 600円。〔ゼリー〕20g 1100円
備考 第15集 p.218 参照。

47. 眼 科 用 剤

Agents for Ophthalmic Use

A IDU 製 剤

5-Iodo-2'-deoxyuridine Preparations

IDU 点眼液 (科研薬)

許可 昭39. 4. 27 発売 39. 7

組成 1000ml 中

5-ヨード-2'-デオキシウリジン 1g

チメロサル 0.03g

適応 単純ヘルペスウイルスに起因する角膜炎。

用法 日中1時間毎、夜間2時間毎に結膜囊内に1〜2滴点眼。

包装 5ml 5 個入4750円。

備考 IDU 点眼液 (住友化学) [第15集 p. 226]

B FAD 製 剤

Flavin adenine dinucleotide

Preparations

ファデミン点眼液 Fademin (中外)

許可 昭39. 3. 21 発売 39. 3. 30

組成 1ml 中

フラビンアデニンジヌクレオチド 0.5mg
(活性ビタミンB₂) (FAD)

作用 活性ビタミンB₂ (FAD) は角膜酸素消費能をいちぢるしく増加させる目的でもちいる。

適応 各種角膜炎、各種結膜炎、眼瞼縁炎、

眼瞼湿疹、眼瞼皮膚炎、眼角膜炎、羞明、流涙、眼精疲労。

用法 1回1〜2滴ずつ1日数回点眼。

包装 5ml瓶 10 1200円、5ml 50個入 5500円。

複合ワカデニン眼軟膏 Wakadenin

(わかもと)

許可 昭39. 4. 9 発売 39.12.15

組成 1g 中

フラビンアデニンジヌクレオチド

(FAD) 1mg

ピリドキサル-5-リン酸 1mg

作用 活性型ビタミンB₂に、角膜や粘膜細胞の代謝を良好にする活性型ビタミンB₆ (ピリドキサル-5-リン酸)を配して協力効果を期待したもの。

適応 眼瞼縁炎、湿性眼瞼炎、眼角膜炎、フリクテン性結膜炎、角膜潰瘍、滲浸性表層角膜炎、点状表層角膜炎、角膜周擁充血、羞明、流涙、眼精疲労。

用法 1日1〜数回患部に塗布又は塗入。

包装 5g 5 個入1200円、5g 25個入 5300円。

備考 第11集 p.194 参照。

C 副腎皮質ホルモン製剤

Glucocorticoid Preparations

テラ・コートリル油性点眼液

Tera-Cortril (台糖ファイザー)

許可 昭37. 3. 27 発売40. 2

組成 流動パラフィン基剤 1ml 中

塩酸オキシテトラサイクリン 5mg

酢酸ヒドロコルチゾン 15mg

適応 ①眼角膜炎、眼瞼縁炎、麦粒種、コッホウィークス菌性結膜炎、肺炎双球菌性結膜炎、モラクサ・アクセンフェルド双桿菌性結膜炎、淋菌性結膜炎、単純性結膜炎、眼部帯状ヘルペス、眼部外傷並びに手術後の感染予防、②炎症性・アレルギー性・フリクテン性・非特異性の眼疾患。

用法 1回1〜2滴ずつ1日3回点眼。

(204) 47 眼科用剤

包装 5ml 瓶入。

備考 第7集 p.148 コートリル眼軟膏参照。

サンテゾーン Santeson (参天製薬)

許可 昭39. 6. 4 発売 39. 7. 1

組成 1ml 中

デキサメサゾンスルホベンゾエート
0.3mg

(デキサメサゾンとして 0.02%)

適応 湿疹性眼瞼炎、眼瞼縁炎、薬物性眼瞼炎、眼瞼火傷、アレルギー性眼瞼炎、アレルギー性結膜炎、フリクテン性結膜炎、春季カタル、急性結膜炎、角膜フリクテン、鞏膜炎、上鞏膜炎、虹彩炎、毛様体炎、原田氏病、ベーチェット病。

用法 1日数回、1回2～3滴ずつ点眼。

包装 5ml 容器 20個入 5000円、100ml 瓶入 4500円。

点眼(点耳)用リンデロン液 (塩野義)

許可 昭39.10. 7 発売 40. 1. 14

組成 1ml 中

リン酸ベタメサゾンナトリウム 1mg

適応 湿疹性眼瞼炎、眼瞼縁炎、アレルギー性眼瞼炎並びに結膜炎、眼瞼並びに結膜火傷、流行性角結膜炎、トラコーマ、フリクテン性結膜炎、角膜フリクテン、表層角膜炎、結核性角膜実質炎、蚕蝕性角膜潰瘍、束状角膜炎、深層角膜炎、角膜火傷、鞏膜炎、虹彩炎、手術後の後療法、外耳炎、外耳湿疹、急・慢性アレルギー性鼻炎、耳鼻科的手術後の処置。

用法 眼疾患には1回1～2滴、1日3～5回点眼、耳疾患には1回2～3滴、1日1～3回点耳する。

包装 5ml 瓶 1400円。

D そ の 他

Miscellaneous

コンドロロン点眼液 1%・3% Chondron

(科研薬)

許可 昭39. 1. 28 発売 39. 5

組成 1000ml 中

	1%	3%
コンドロイチン硫酸 Na	10g	30g
チメロサル	0.03g	0.08g

適応 角膜炎、角膜潰瘍及び浸潤、手術創及び手術後の角膜混濁、角膜異物による角膜障害、コンタクトレンズによる角膜障害の予防及び治療、角膜上皮剝離、角膜乾燥症、結膜炎、眼瞼縁炎。

用法 1回1～2滴、1日2～4回結膜囊内に点眼。

包装 [1%] 100ml 1250円、5ml 60個入 3750円、[3%] 5ml 60個入 4500円、100ml 1500円。

スマリン・ダイヤ Smarin・Dia

(エスエス)

許可 昭39. 4. 27 発売 39. 9. 1

組成 13ml 中

アラントイン	0.4%
塩酸ピリドキシン	0.003%
メチルヘスベリジン	0.002%
チメロサル	0.003%
タウリン	0.7%
ホウ酸	0.8%
ホウ砂	0.01%
トメントール	0.006%
竜腦	0.006%

適応 眼精疲労、結膜充血、角膜充血、紫外線その他光線による眼炎。

用法 13ml 220円。

備考 第15集 p.227 参照。

スラー Suler (大昭和)

許可 昭39. 9. 18 発売 39. 12

組成 100ml 中

塩酸ナファゾリン	50mg
塩酸ピリドキシン	200mg
ホウ酸	1340mg
ホウ砂	150mg
チメロサル	5mg
乳酸亜鉛	100mg
コンドロイチン硫酸ナトリウム	100mg

適応 結膜炎、疲労眼、角膜炎、充血、流